

**Tabel 3. Overzicht aanvullende diagnostiek en behandeling medisch specialist**

	<b>Knik in functioneren</b>	<b>Vallen</b>	<b>Acute verwardheid</b>	<b>Cognitieve stoornissen</b>
Anamnese en lichamelijk onderzoek naar oorzaken en risicofactoren	✓	✓ Richtlijn: <a href="#">valincidenten</a>	✓ Richtlijn: <a href="#">delier</a>	✓ Richtlijn: <a href="#">dementie</a>
Hetero-anamnese	Op indicatie	Op indicatie	✓	✓
Medicatie check Richtlijn: <a href="#">polyfarmacie bij ouderen</a>	✓	✓	✓	✓
Lab onderzoek	✓	✓	✓	✓
Urinesediment	✓	Op indicatie	✓	Op indicatie
X-thorax	Op indicatie	Op indicatie	✓	Op indicatie
ECG	Op indicatie	✓	✓	Op indicatie
Beoordeling door paramedici (fysio/diëtist/ergotherapeut)	Op indicatie	✓ Fysio (mobiliteit/balans/ spierkracht/conditie)	Op indicatie	Op indicatie (bv ADL check)
Beeldvorming (CT / MRI hersenen)	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie (laagdrempelig)	Op indicatie (laagdrempelig)
Neuropsychologisch onderzoek (NPO)	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie
Overig aanvullend onderzoek (bv liquor punctie, PET scan, beenmerg)	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie
Behandeling	Volgens (lokale) richtlijn	Volgens (lokale) richtlijn	Volgens (lokale) richtlijn	Volgens (lokale) richtlijn
Follow up poliklinisch	Op indicatie	Op indicatie	Op indicatie (voor analyse cognitie en voorlichting delierrisico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorijden wordt besproken</li> <li>• Starten / niet starten choline-esteraseremmer wordt</li> </ul>

				<p>besproken + vervolgafspraken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bij diagnose MCI: retour poli na 1 jaar</li><li>• Verwijzend arts en medisch specialist stemmen onderling vervolgafspraken af</li></ul>
--	--	--	--	---