

Longformularium Midden-Nederland

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het formularium zijn te vinden via rsotrijn.nl.

Partners



Keus droogpoederinhalator en aerosol

Droogpoederinhalator (DPI)

Eerste keus vanwege gebruiksgemak en milieuoverwegingen.

Aerosol (altijd met voorzetskamer)

Alternatief voor patiënten die één-teug-inhalatie niet beheersen en/of over te weinig inhalatiekracht beschikken.



AeroChamber



Vortex

Inhalatiekracht

Middelen met het icoon hiernaast moeten krachtig gehaleerd worden, de andere rustig. Inhalatiekracht kun je controleren met de Incheck Dial.



astma

	SABA	ICS	ICS/ LABA
DROOGPOEDERINHALATOR	<p>Terbutaline Turbuhaler (Bricanyl®)</p>	<p>Budesonide Turbuhaler (Pulmicort®)</p>	<p>Budesonide/Formoterol Turbuhaler (Symbicort®)</p>
	<p>Salbutamol Diskus (Ventolin®)</p>	<p>Fluticason Diskus (Flixotide®)</p>	<p>Fluticasonfuroaat / Vilanterol Ellipta (Relvar®)</p>
AEROSOL - ALTIJD MET VOORZETKAMER	<p>Salbutamol</p>	<p>Beclometason of Ciclesonide</p>	<p>Beclometason / Formoterol</p>

Overweeg bij verzekerden VGZ overstap op een andere lijn of medische noodzaak.

Beclometason: lagere kosten
Ciclesonide: 1 x daagse dosering en lagere carbon footprint

Astmatherapiestappen - optie A (ICS-formoterol)

- Bij incidentele klachten: Lage dosis ICS/formoterol zo nodig
- Twee keer of vaker klachten per week: Lage dosis ICS/formoterol onderhoud
- Bij onvoldoende astmacontrole: Hogere dosis ICS/formoterol

Astmatherapiestappen - optie B

- Bij incidentele klachten: SABA zo nodig
- Twee keer of vaker klachten per week: lage dosis ICS
- Bij onvoldoende astmacontrole: lage dosis ICS met LABA (bij piepen) of intermediaire dosis ICS zonder LABA (bij bijwerkingen beta-receptor agonist)
- Bij aanhoudend onvoldoende astmacontrole: Intermediaire tot (tijdelijk) hogere dosis ICS + LABA (bij piepen) of hogere dosis ICS zonder LABA (bij bijwerkingen beta-receptor agonist)

COPD



- Gebruik ICS uitsluitend bij persisterende exacerbaties of astmacomponent
- Staak ICS bij geen vermindering aanvallen in 1 jaar of > 2 jaar aanvalsvrij

DROOGPOEDERINHALATOR

SABA

SAMA

LABA

LAMA

LABA/LAMA

ICS

ICS/LABA

ICS/LABA/LAMA



Salbutamol Diskus (Ventolin®)



Salmeterol Diskus (Serevent®)



Umeclidinium Ellipta (Incruse®)



Umeclidinium / Vilanterol Ellipta (Anoro®)



Fluticasonfuroaat / Vilanterol Ellipta (Relvar®)



Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium Ellipta (Trelegy®)



Salbutamol Novolizer



Formoterol Novolizer



Aclidinium Genuair (Bretaris®, Eklira®)



Aclidinium / Formoterol Genuair (Duaklir®)



Budesonide Novolizer

samen te stellen

samen te stellen



Salbutamol



Ipratropium



Formoterol

In de aerosolenlijn mist de LAMA-stap. Geef LABA tenzij er sprake is van intoleranties of interacties. In dat geval is er sprake van maatwerk.



Formoterol / Glycopyrronium



Beclometason / Formoterol



Beclometason / Formoterol / Glycopyrronium

AEROSOL - ALTIJD MET VOORZETKAMER

Therapiestappen COPD

minder dan twee longaanvallen per jaar:

- Zeldzame klachten: SABA of SAMA
- Regelmatige klachten, hinder of beperkingen: LAMA óf LABA
- Persisterende klachten, hinder of beperkingen: LAMA én LABA

twee of meer longaanvallen per jaar:

Voeg ICS toe. Triple therapie alleen na overleg met de tweedelij.

Inhalatieinstructies (inhalatorgebruik.nl)



Type **weerstand**



Diskus medium low (30)



Ellipta medium low (30)



Genuair medium (40)



Novolizer medium (50)



Turbuhaler medium high (50)