



Regionale afspraken

Atriumfibrilleren

Screenen van Atriumfibrilleren (AF)

We spreken regionaal af om atriumfibrilleren primair op te sporen via opportunistische screening; systematische screening kan facultatief worden toegepast (zie NHG-richtlijn en handreiking NVVC). De diagnose atriumfibrilleren moet altijd worden bevestigd met een ECG: een één-afleiding (ritmestroom) van minimaal 30 seconden of een meerdere-afleidingenopname van minimaal 10 seconden.



Regiefunctie en medicatiebeleid

Medicatie wordt voorgeschreven door of onder supervisie van de regiebehandelaar. De voorschrijvend arts is verantwoordelijk voor;

- herhaalrecepten,
- controle van de nierfunctie,
- bij overdracht van een patiënt relevante adviezen, zoals nierfunctiecontrole, schriftelijk vastleggen.

Verwijzing bij co-morbiditeit

Slaapapneu

- Tweede lijn: verwijst intern binnen het ziekenhuis.
- Derde lijn: verzoekt huisarts om te verwijzen naar een tweedelijns longarts.

CVRM

- Patiënt kan terug verwezen worden naar huisarts, ook als patient onder behandeling van AF bij de specialist blijft.
- In de brief aan de huisarts moeten duidelijk worden vermeld:
 - Bevindingen,
 - Gestarte behandeling,
 - Expliciet verzoek tot overname van CVRM-zorg.

DOAC's en nierfunctie

Tijdens het opstellen van dit document is afgesproken dat in de regio Utrecht de DOAC's bij nierfunctiestoornissen vooralsnog worden gedoseerd conform smPC. Indien hiervan wordt afgeweken, dient dit op het recept gemotiveerd te worden.

Zie ook RTA DOAC's op website RSOTrijn.nl



Voorlichting patiënt

De regiebehandelaar start de informatievoorziening en voorlichting over AF, de behandeling en leefregels, afgestemd op de motivatie en mogelijkheden van de patiënt.




Ontdenk nog meer RTA's op onze website.



Regionale afspraken Atriumfibrilleren

Behandeling & terugverwijzing



¹Overweeg bij niet vitale pt met AF korter van 48 uur én veel klachten direct overleg met dd cardioloog

²Bij score 1 antistolling overwegen (mede gebaseerd op ESC-richtlijn)

³Contra-indicaties antistolling: recente bloeding of operatie, stollingsstoornis, ernstige leverfunctiestoornis, oesophagusvarices, AV malformatie of aneurysma

⁴Mechanische hartklepprothese, mitralisstenose, ernstige leverfunctiestoornis of EGFR <15ml/min (daarboven zn middel en/of dosis aanpassen)